AstraZeneca

▶▶▶ WEBINAR

Los ponentes expresarán por sus autores no refleja necesariamente la posición de AZ S.A.

Hiperpotasemia en el paciente trasplantado renal y en el paciente con insuficiencia renal crónica

Estimado Dr/a.

Le informamos que AstraZeneca, con el aval científico de la Sociedad Española de Nefrología ha organizado un webinar con el objetivo de debatir sobre el manejo clínico de la **Hiperpotasemia en el paciente trasplantado renal y en el paciente con insuficiencia renal crónica.**

El evento online tendrá lugar el próximo **7 de abril, de 17.00h a 18.30h.**

¡Esperamos su participación y le animamos a debatir con los expertos en el espacio de debate!

INSCRÍBASE AQUÍ

Hiperpotasemia en el paciente trasplantado renal y en el paciente con insuficiencia renal crónica

- **17:00 - 17:05** ▪ **Presentación de la reunión.** Dr. Lluís Guirado Perich
- **17:05 - 17:25** ▪ **Epidemiología y causas de hiperpotasemia en la población trasplantada renal.** Dra. Ana Sánchez Fructuoso
- **17:25 - 17:45** ▪ **Tratamiento de la hiperpotasemia del paciente trasplantado renal. Indicaciones para la prescripción con Lokelma. Medicación inmunosupresora asociada.** Dr. Lluís Guirado Perich
- **17:45 - 18:05** ▪ **Experiencia clínica con Lokelma en el tratamiento de la hiperpotasemia del paciente con insuficiencia renal crónica. Casos clínicos.** Dra. Meritxell Ibernon Vilaro

Moderador:

Dr. Lluís Guirado Perich
Servicio de Nefrología, Fundación Puigvert, Barcelona

Ponentes:

Dra. Ana Sánchez Fructuoso
Servicio de Nefrología, Hospital San Carlos, Madrid

Dra. Meritxell Ibernon Vilaro
Servicio de Nefrología, Hospital De Sant Joan Despi Moises Broggi, Barcelona

LOKELMA®
polvo para suspensión oral
ciclosilicato de sodio y potasio

Para cualquier consulta, puede escribirnos un email a:
sandra.poyato@acuam.com

CONTACTA AQUÍ

¡Muchas gracias por su atención!

LOKELMA® reduce los niveles de K^+ a partir de una hora desde la primera dosis[1]
LOKELMA® mantiene los niveles de K+ controlados a largo plazo[1]
LOKELMA® es generalmente bien tolerado, fácil de tomar, insípido e inodoro[1,2]

SKA: comms.technical@astrazeneca.com
(*) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nuevas información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas.

De acuerdo con el RD 1277/2013 por el que se regula la farmacovigilance de medicamentos de uso humano, los profesionales sanitarios deben notificar las sospechas de reacciones adversas de los medicamentos autorizados en España, incluyendo los medicamentos biológicos y los medicamentos homeopáticos, a través de la Tarjeta Amarilla en papel o por internet (www.notifica.es). Para ello, se pueden utilizar cualquier medio de contacto con el Sistema Español de Farmacovigilance a través de la página www.comunidad.aemps.es/ ó www.aemps.es/ ó

Si no desea recibir más comunicaciones de Veeva Approved Email por correo electrónico, por favor, envíenos un mensaje a este director de correo y automáticamente cuando haya en nuestro servicio de notificaciones por email.

Para hacer la solicitud, la política de privacidad de datos puede consultar el siguiente enlace: https://www.globalprivacy.astrazeneca.com/es
Además, puede contactar con Farlo2mano a través de www.farlo2mano.com para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación a los datos personales que consentiría sobre usted, para consigo cualquier otro, solicitar la eliminación de los mismos o retirar su consentimiento para ciertos tipos de procesamiento de sus datos personales.

FICHA TÉCNICA PROMOCIONAL ▼ (Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nuevas información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver ficha técnica para información de prescripción y reacciones adversas.) **LOKELMA® 5 g polvo para suspensión oral.** Ciclosilicato de sodio y potasio. **1 SUSPENSIÓN ORAL CONTIENE:** Ciclosilicato de sodio y potasio 5 g. **2 FORMA FARMACÉUTICA:** Polvo para suspensión oral. Polvo blanco. **3 CLÍNICAS:** **3.1 Indicaciones terapéuticas:** Tratamiento de la hiperpotasemia en adultos. **3.2 Posología y forma de administración:** Posología Adultos: Inicialmente tres sobres de suspensión de 5 g, administrados tres veces al día para los primeros 24 horas de tratamiento, en adelante otro sobre de suspensión de 5 g, administrado una vez al día. Ajuste de dosis: Se puede ajustar la dosis a un sobre de suspensión de 5 g, administrado cada 48 horas, en función de los niveles de potasio sérico tras 48 horas de tratamiento, en adelante otros ajustes de tratamiento. Fase de mantenimiento: Una vez alcanzada la normopotasemia, se debe establecer la dosis mínima eficaz de Lokelma para prevenir la recurrencia de hiperpotasemia, con un máximo de un sobre de suspensión de 5 g, administrado una vez al día. Se puede considerar un ajuste de dosis a un sobre de suspensión de 5 g, administrado cada 48 horas. Niños: No se ha establecido la seguridad y eficacia de Lokelma en niños. Se dispone de datos limitados (ver sección 5.2). Modo de administración: Vía oral. Se debe disolver el contenido de un sobre de suspensión de 5 g en aproximadamente 10 ml de agua y se debe tomar inmediatamente después de su preparación. **3.3 Contraindicaciones:** Ninguna conocida. **3.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:** Lokelma no se debe administrar a pacientes con hipopotasemia, ya que alterar el nivel de potasio plasmático en dichos pacientes puede aumentar el riesgo de arritmias. Se debe evitar el uso de potasio suplementario o ahorradores de potasio en pacientes que reciben Lokelma. Lokelma contiene sodio, se debe considerar en pacientes con insuficiencia cardiaca o hipertensión. Lokelma contiene sorbitol, sorbitol e hexitoles no usados como intolerancias hereditarias de fructosa. El ciclosilicato de sodio y potasio puede ser ingerido por pacientes con insuficiencia renal o hepática. **3.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:** Dieta de alto medicamento sodio y el ciclosilicato de sodio y potasio: El ciclosilicato de sodio y potasio se administra en forma de polvo para suspensión oral. Se debe disolver el contenido de un sobre de suspensión de 5 g en aproximadamente 10 ml de agua y se debe tomar inmediatamente después de su preparación. Lokelma contiene sodio, se debe considerar en pacientes con insuficiencia cardiaca o hipertensión. Lokelma contiene sorbitol, sorbitol e hexitoles no usados como intolerancias hereditarias de fructosa. El ciclosilicato de sodio y potasio puede ser ingerido por pacientes con insuficiencia renal o hepática. **3.6 Fertilidad, embarazo y lactancia:** Lokelma no se debe administrar durante el embarazo. **3.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas:** No procede. **3.8 Efectos adverso:** Resumen del perfil de seguridad: Lokelma se administró a 1.718 pacientes, con 507 pacientes expuestos durante un año. En la Table 1 se muestran las reacciones adversas identificadas en ensayos clínicos y en el uso post-comercialización. Table 1 Reacciones adversas identificadas en ensayos clínicos y en el uso post-comercialización. Frecuencia Sistema de Clasificación de Órganos (SOC) Muy frecuentes (≥ 1/10) Frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10) Poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100) Raros (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) Muy raros (< 1/10.000) Infecciones e infestaciones Infecciones del tracto urinario, Infecciones del tracto respiratorio, Infecciones del tracto gastrointestinal, Infecciones del tracto genital, Infecciones del tracto cutáneo, Infecciones del tracto vascular, Infecciones del tracto óseo, Infecciones del tracto muscular, Infecciones del tracto ocular, Infecciones del tracto auditivo, Infecciones del tracto linfático, Infecciones del tracto nervioso, Infecciones del tracto endocrino, Infecciones del tracto respiratorio, Infecciones del tracto gastrointestinal, Infecciones del tracto genital, Infecciones del tracto cutáneo, Infecciones del tracto vascular, Infecciones del tracto óseo, Infecciones del tracto muscular, Infecciones del tracto ocular, Infecciones del tracto auditivo, Infecciones del tracto linfático, Infecciones del tracto nervioso, Infecciones del tracto endocrino, Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración Edema periférico, Edema periférico, Edema periférico,